

# 「富富富」情報(第1号)

平成30年5月2日

J Aなのはな「富富富」ブランド化推進協議会

富山米新品種「富富富」の栽培が始まります！

品種特性に応じた適確な管理作業により、高品質・良食味生産に努め、  
本県を代表するブランド米として育成しましょう。



## 1 基肥の適正な施用

- ・基肥施用量は**コシヒカリの2割減**としてください。

表1 施肥基準

(10a当たり)

土質	分施						肥効調節型基肥
	側条施肥		全層施肥				側条施肥
	設計 I	設計 II	設計 I		設計 II		富富富専用 全量基肥肥料
	なのはな 有機基肥	燐加安 15号	基肥	早期追肥 (田植後7日)	基肥	早期追肥 (田植後7日)	
砂質田	28kg	24kg	24kg	10kg	20kg	10kg	32kg
壤質田	24kg	20kg	20kg	10kg	16kg	10kg	28kg
粘質田	20kg	16kg	16kg	10kg	12kg	10kg	-

※転作跡田で作付する場合は分施栽培とし、「大豆あとコシヒカリ」等の栽培方法に応じて基肥量を減らしてください。

## 2 適切な田植作業の実施

- ・育苗は換気の徹底により健全な苗に仕上げましょう。
- ・早植えはくず米の増加、遅植えは収量の低下などを招きます。**田植えは5月15日を中心に実施**しましょう。
- ・**栽植密度は70株/坪を基本**とし、植付本数3~4本/株、植付深さ3cmとなるよう田植機を調整しましょう。
- ・苗箱施薬剤の使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう。

## 3 初期の水管理と雑草防除の徹底

- ・**移植後はやや深水**にして活着を促進し、**活着後は浅水管理**により水温の上昇に努め、分げつの発生を促進しましょう。
- ・除草剤の使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう。

表2 雑草防除体系例

区分	薬剤名	使用時期	使用量	対象雑草	成分数
初期剤	マーシット1キロ粒剤	移植後3~5日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツバイ ホタルイ、ミズガヤツリ	1
一発処理剤	ガンガン1キロ粒剤	移植後14日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツバイ ホタルイ、ミズガヤツリ、 ウリカワ等	2
	又は キクンジャーZ1キロ粒剤		1kg/10a		

春の農作業安全運動実施中！（4月1日～5月31日）