

「富富富」情報(第2号)

平成30年5月

J Aなのはな「富富富」ブランド化推進協議会

富富富の田植えは、概ね天気恵まれて順調に行われました。
今後は充実した茎を確保するため、次に留意して適切に管理しましょう。

1 中干しまでの水管理

中干しまでは、水深2～3cm程度の**浅水管理**を行い、分げつの発生を促進しましょう。

※入水は早朝に行い、日中は止水で、田水温の上昇に努めましょう。

※田がわいたり、藻が発生した場合は、水の入れ換えや軽い田干しを行いましょう。

2 溝掘り

中干しの効果を高めるために、6月上旬までに**溝掘り**を実施しましょう。

※効率的に入水・落水ができるよう10～15条に1本を目安に溝を掘り、溝はしっかり水尻に連結しましょう。

3 中干し

中干しは、田植後1か月頃を目安に始め、無効分げつの発生を抑えましょう。

※中干しの程度は、長靴が沈まない程度(3～5日間)の田干しを基本とし、水はけの悪い田や粘質土壌等では強め(5～7日間)にしましょう。数回に分けて適度に田干しを行いましょう。



中干しが遅れると、田がわき、下葉が枯れ始め、稲の活力が低下します。
こうなる前に**適期に中干し**しましょう。

4 雑草防除

雑草が残った場合は、必要に応じて除草剤を遅れずに散布しましょう。

※除草剤の効果を高めるため、散布前に軽い田干しを行い、水を入れ替えてから散布しましょう。

※除草剤散布の際には、使用基準を遵守し、周辺の作物に飛散しないよう注意しましょう。

表 随時除草剤の使用基準

対象雑草	薬剤名	使用時期	10a 当たり使用量	成分数
ノビエ	クリンチャー1キロ粒剤	田植後7日～ノビエ4葉期まで (収穫30日前まで)	1kg	1
		田植後25日～ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5kg	1
	クリンチャーEW	田植後20日～ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)	100ml (希釈水量100L)	1
広葉雑草	バサグラン粒剤	田植後15～50日まで (収穫60日前まで)	3～4kg	1
	バサグラン液剤	田植後15～50日まで (収穫50日前まで)	500ml (希釈水量100L)	1
ノビエ 広葉雑草	ワイドアタックSC	田植後25日～ノビエ5葉期まで (稲6葉期以降、収穫30日前まで)	100ml (希釈水量100L)	1

※種子消毒から本田防除までの化学合成農薬の**成分使用回数**が**12以内**となるように留意しましょう。