

## 防除日の変更について（号外第2号）

### 開花の早回りにより、防除日を再度、早めます！！

平成30年4月3日  
富山農林振興センター  
なのはな農業協同組合

現在、梨の生育は、今冬の十分な低温遭遇と近日の高温の影響により、平年に比べかなり早く進んでいます。このことから今後の防除日を、下記のとおり、再度、変更しますので、注意願います。

#### 【防除スケジュール（吉作：「幸水」基準）】

		散布月日	薬剤名と濃度		散布量	主な対象病害虫	防除実施日 (自己記入)
3	変更	4月9～11日 (開花直前) 1分咲き	スコア顆粒水和剤 ベルコートフロアブル	4,000倍 1,500倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、 輪紋病、黒斑病 うどんこ病	
4	変更	4月17～19日 (落花直後)	トレノックスフロアブル	500倍	300 ℓ	黒星病、赤星病 うどんこ病	
5	変更	4月25～27日 (落花10日後)	マネージ DF トレノックスフロアブル ハチハチフロアブル	6,000倍 500倍 2,000倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、 芯腐れ症 (胴枯病菌) ニセナシサビダニ	

#### 【注意点】

- 今後（10日間）の天気予報では降雨日が多いと予報されており、黒星病の孢子飛散が本格的に開始されることが懸念されます。
- 第3回目の防除は、治療効果が期待される重要な殺菌剤散布となりますので、晴れ間をみて確実に実施するようお願いします。
- 上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としていますが、本年は地域間の生育差が小さいので、自園地の生育状況を十分確認して、防除が遅れないように注意してください。